



WSAVA

Comité Global
para a Nutrição

Guia de Alimentação para Cães e Gatos Hospitalizados

Quando intervir num paciente hospitalizado

Dias de anorexia/ hiporrexia (incluir dias de anorexia/ hiporrexia em casa)



5 dias: É necessário suporte nutricional
Colocar sonda de alimentação ou iniciar nutrição parentérica



3-4 dias: É provável que seja necessário suporte nutricional se a recuperação não for iminente.
Considerar colocação de sonda de alimentação se o paciente for anestesiado.



1-2 dias: Redija instruções diárias para alimentação, monitorização da ingestão de alimento e da condição clínica.

Nota: se o paciente já se encontrar subnutrido, deve iniciar-se suporte nutricional assim que estiver hemodinamicamente estável

Crie um plano para os pacientes hospitalizados

Crie um plano para alimentação (ou seja, dieta, via, quantidade e frequência). O objectivo consiste em atingir as necessidades energéticas em repouso (RER), embora possa demorar 2 a 3 dias a atingir este valor.

1. Se o paciente for capaz de se alimentar, ensaie alimentação oral voluntária ou forçada. Escreva instruções específicas para alimentação: "Oferecer ¼ de lata da dieta X pela via oral a cada 6 horas" (dieta, via, quantidade, frequência)
2. Monitorize a ingestão. Se não for atingida uma quantidade adequada de alimento pela via oral, são necessárias metodologias de alimentação assistida.



Peso* (kg)	RER (Kcal/dia)	Peso* (kg)	RER (Kcal/dia)
1.0	70	15.0	534
1.5	95	16.0	560
2.0	118	17.0	586
2.5	139	18.0	612
3.0	160	19.0	637
3.5	179	20.0	662
4.0	198	22.5	723
4.5	216	25.0	783
5.0	234	27.5	841
5.5	251	30.0	897
6.0	268	32.5	953
6.5	285	35.0	1007
7.0	301	37.5	1061
7.5	317	40.0	1113
8.0	333	42.5	1165
8.5	348	45.0	1216
9.0	364	47.5	1267
9.5	379	50.0	1316
10.0	394	52.5	1365
11.0	423	55.0	1414
12.0	451	57.5	1462
13.0	479	60.0	1509
14.0	507		

